# TEMA 2000

## SCHEDA TECNICA



**ORIGINE** Selezione clonale di mutante precoce comparso nella cultivar Terom, soggetta a moltiplicazione intensiva a partire dal 1980.

**PIANTA** Presenta foglie disposte a rosetta, di colore verde lucido. Al centro della rosetta fogliare, può raggiungere 1 m di altezza, si sviluppa uno scapo fiorale con capolini di 1°, 2° e 3° ordine, di forma ovale allungata e brattee appuntite terminant i con una

**CAPOLINI, DIMENSIONI E FORMA** I capolini di 1° ordine sono ovali allungati, 8-10 cm, con un peso di 120-160 g; i capolini di 2° e 3° ordine sono ovali compressi, 7-8 cm, con un peso di 120-140 g, quelli di 4° ordine (carciofini) sono ancora più piccoli. Il colore è violetto intenso

**BRATTEE** Il colore delle brattee esterne è violetto intenso, mentre quelle interne sono giallo paglierino. Si presentano carnose e tenere, ma meno numerose e serrate rispetto a quelle del terom.

**PRODUZIONE** In Sardegna si possono raccogliere da 10-12 capolini a pianta in autunno e 5-6 in primavera, ma quest'ultimi sono meno apprezzati in quanto di qualità inferiore rispetto a quelli del terom. Interessante anche la maggiore resistenza al freddo rispetto ad altre varietà rifiorenti come Violetto e Spinoso Sardo

**EPOCA DI PRODUZIONE** In Sardegna la produzione inizia a fine Settembre e si interrompe a fine Dicembre o inizio Gennaio in corrispondenza delle prime gelate, riprende poi in primavera sulle nuove piante originatesi dai ricacci laterali.

**Periodo di raccolta**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Febbraio | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Marzo | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Aprile | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Maggio | ■ | ■ | □ | □ |
| Giugno | □ | □ | □ | □ |
| Luglio | □ | □ | □ | □ |
| Agosto | □ | □ | □ | □ |
| Settembre | □ | □ | ■ | ■ |
| Ottobre | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Novembre | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Dicembre | ■ | ■ | ■ | ■ |